CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE SEMENTES DE UMA POPULAÇÃO ANTROPOGÊNICA DE ESPINHEIRA-SANTA

Mirela Pereira Machado Lunardi¹; Ingrid Bergman Inchausti de Barros¹; Maria Teresa Schifino-Wittmann¹; Rodrigo Sampaio Santos¹; Luiz Osório de Castro.

RESUMO

Espinheira-santa é uma planta medicinal nativa no sul do Brasil. Amplamente utilizada na medicina popular e a sua eficácia em gastrites está comprovada cientificamente. O intenso extrativismo, provocou reduções drásticas da espécie em seus locais de ocorrência. Para o estabelecimento de cultivos, como estratégia para sua conservação e obtenção de matéria prima, são necessários estudos para definir formas de propagação. Objetivando caracterizar fisicamente sementes de Espinheira-santa, foi analisada uma população antropogênica de Viamão, RS, quanto ao peso médio de sementes por categoria de frutos entre diferentes árvores, peso médio de sementes de cada árvore e o número médio de sementes por fruto. Observou-se maior incidência de frutos contendo 1 semente (46%), seguida de frutos contendo 2 sementes (31%), 3 (16%) e 4 (7%) e um comportamento linear da variação do peso médio das sementes por categorias de frutos entre as diferentes árvores. Houve diferença significativa no peso médio das sementes entre árvores.

Palavras-chaves: *Maytenus ilicifolia*, planta medicinal, espécie nativa, descritores.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde recomendou programas relativos à identificação, avaliação, preparo, cultivo e conservação de plantas usadas na medicina popular (Akerle, 1988). O documento “Estratégia Global da Biodiversidade” cita sérias ameaças de extinção ou perda da variabilidade genética no ambiente silvestre, e enfoca a importância da manutenção das práticas tradicionais de medicina das comunidades locais, propondo o cultivo das plantas medicinais (WRI/UICN/PNUMA, 1992).

Espinheira-santa (*Maytenus ilicifolia* Mart ex Reiss - Celastraceae) é uma espécie medicinal nativa do sul do Brasil, de habitat de sub-bosque das florestas de araucária, capões ou matas ciliares (Carvalho-Okano, 1992). Suas folhas são amplamente utilizadas como antiasmáticas, anticonceptivas, em tumores estomacais, entre outros (Simões *et al.*, 1995). Em 1988, a CEME comprovou a ação da Espinheira-santa nos tratamentos de

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Faculdade de Agronomia – Departamento de Horticultura e Silvicultura – Caixa Postal 776, CEP 91501-970 – Porto Alegre, RS – e-mail: mirela.lunardi@ufrgs.br

gastrite e úlceras gástricas, o que levou a um aumento na demanda de matéria prima e a um extrativismo desenfreado nas áreas de ocorrência natural da espécie. Atualmente a espécie é considerada rara e está incluída na “Lista Vermelha de plantas ameaçadas de extinção no Estado do Paraná”.

Este trabalho objetivou caracterizar fisicamente sementes de Espinheira-santa originárias de uma população antropogênica estabelecida em Viamão, RS, visando obter e disponibilizar informações básicas para subsidiar futuros estudos como, germinação de sementes, produção de mudas e cultivo.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido nos Laboratórios do Departamento de Horticultura e Silvicultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, RS, com frutos maduros de Espinheira-santa, coletados de uma população antropogênica da Estação Experimental da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) em Viamão, RS. Esta população foi formada a partir de sementes coletadas em regiões do Estado, representando uma grande variabilidade, e foi plantada em linhas numa área experimental. Para identificar cada árvore foi utilizada uma nomenclatura que reflete a sua localização: o primeiro número refere-se à linha de plantio, a letra A representa a área e o segundo número, a ordem de disposição dentro da linha.

Os frutos foram secos em temperatura ambiente, os arilos retirados manualmente, e registrou-se o número médio (NM) de sementes por fruto e o peso médio (PM) de sementes por categoria de frutos. Foram analisadas as variáveis: PM de sementes por categorias de frutos (com 1, 2, 3 e 4 sementes) entre as diferentes árvores e PM de sementes entre as diferentes árvores.

Os dados foram submetidos à análise de variância, as médias comparadas pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade, e feita análise de regressão, utilizando o programa SAS (Statistical Analysis System).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados um total de 4266 frutos de 23 plantas, onde observou-se que o NM de sementes por fruto variou de um a quatro e a maior incidência foi de frutos contendo uma semente (46%), seguida de frutos com duas sementes (31%), três(16%) e quatro (7%). Estes resultados concordam com Carvalho-Okano (1992) quanto a variação da quantidade, porém a maior incidência encontrada pela autora, foi de duas e três sementes por fruto (valores provenientes de observações e não de contagens com

número significativo de frutos), diferenciando-se deste estudo. Rosa (1998) encontrou de uma a quatro sementes por fruto, com maior incidência de uma (78,5%), seguida duas (17,4%), três (3,9%) e muito raramente quatro (0,2%), de acordo com este trabalho, no entanto, os valores percentuais diferiram significativamente. Lunardi *et al* (2003) estudando três populações naturais de Espinheira-santa verificaram maior ocorrência de frutos contendo duas sementes (40%), uma (25%), três (23%) e quatro (12%). Devido às grandes diferenças encontradas nestes estudos com diversas populações, sugere-se que estas características sejam devido aos genótipos e/ou à fatores ambientais.

Com relação a comparação do PM das sementes entre árvores, houve diferença significativa, tendo a árvore 1/A1 o maior PM (Tabela 1). Como este estudo foi realizado com árvores coletadas de diferentes locais, portanto representando uma grande variabilidade, já era esperado que ocorressem estas diferenças.

TABELA 1: Comparação do peso médio de sementes entre árvores de uma população antropogênica de espinheira-santa. Porto Alegre, UFRGS, 2003.

Árvore	Peso médio (g)		Árvore	Peso Médio (g)	
1/A1	0,0347	a	1/A7	0,0247	fg
6/A8	0,0315	b	8/A3	0,0225	gh
6/A7	0,0307	bc	5/A5	0,0222	h
2/A2	0,0297	bcd	4/A6	0,0217	h
7/A3	0,0295	bcd	9/A2	0,0210	hi
7/A1	0,0287	cde	8/A4	0,0207	hi
2/A6	0,0287	cde	8/A2	0,0192	ij
2/A5	0,0285	cde	7/A2	0,0187	ijk
4/A1	0,0280	de	4/A2	0,0187	ijk
4/A5	0,0262	ef	6/A4	0,0172	jk
9/A1	0,0252	f	5/A2	0,0165	k
5/A4	0,0250	f			

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade de erro. Coeficiente de variação: 6,2%. Peso médio geral: 0,02423 g.

Quanto a variação do PM das sementes por categorias de frutos entre as diferentes árvores, foi realizada análise de regressão dos dados, observando-se um comportamento linear: com o aumento do número de sementes por fruto, ocorre uma diminuição do seu PM (Figura 1).

Vários atributos formam um somatório para determinar a qualidade das sementes, cabe salientar aqui os genéticos e físicos, os quais afetam a capacidade de originar plantas de alta produtividade. As diferenças no vigor e no crescimento inicial da plântula estão relacionadas com a quantidade de reservas da semente. Segundo Dan *et al* (1987), isto ocorre em função das sementes apresentarem maior capacidade de transformação e de suprimento de reservas dos tecidos de armazenamento e da maior incorporação

destes pelo eixo embrionário. Sugerindo-se que, ao selecionar genótipos com sementes maiores, mudas mais vigorosas, de crescimento inicial mais rápido e uniformes poderão ser obtidas. Estes itens são extremamente desejáveis no que se refere a produção de mudas em larga escala para o estabelecimento de cultivos.

FIGURA 1: Peso médio de sementes por categorias de frutos entre as diferentes árvores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AKERELE, O. Medicinal plants and primary health care: an agenda for action. **Fitoterapia**, 5, p. 355-363, 1988.
- CARVALHO-OKANO, R. M. **Estudos taxonômicos do gênero *Maytenus* Mol. Emend. Mol (Celastraceae) do Brasil extra-amazônico**. 1992. 253 f. Tese (Doutorado em Biologia Vegetal), Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 1992.
- DAN, E. L. et al. Transferência de matéria seca como método de avaliação do vigor de sementes de soja. **Revista Brasileira de Sementes**, Brasília, v. 9, n. 3, p. 45-55, 1987.
- LUNARDI, M. P. M. et al. Caracterização física de sementes de populações de Espinheira-santa. **Horticultura brasileira**, v. 21, n. 2, suplemento 1, p. 420, 2003. Trabalho apresentado no 43º Congresso Brasileiro de Olericultura, Recife, PE, 2003.
- ROSA, S. G. T. Caracterização das sementes de *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reiss, espinheira santa e viabilidade de sua propagação sexuada. **Plantas medicinais, Aromáticas e Condimentares: avanços na pesquisa agrônômica**, v. II, p. 33-51, 1998.
- SIMÕES, C. M. O. et al. **Plantas da medicina popular no Rio Grande do Sul**. 4º ed. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1995.
- WRI/UICN/PNUMA – WORLD RESOURCES INSTITUTE; THE WORLD CONSERVATION UNION; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. **A Estratégia Global da Biodiversidade**. 1992. 232p (tradução).